

40. 大分県 (Oita Pref.)

作成者名：玉嶋勝範¹⁾ 協力者名：三宅 武 作成年月：2019年12月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している産地 (市町村)	現在減少傾向にある 産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考 (対策・文献など)
EX	ウ	EX	ルーミスシジミ	—	—	中津市（三光村）	1950年に三光村で採集されたが、その後の記録はない。新たな生息地は未だ確認されていない。	生息地の森林伐採	大分県RDB選定 情報不足
EX	ア	EX	ヒメシジミ	—	—	由布市（庄内町），竹田市（久住町），九重町	久住町、庄内町では1970年代以降の記録はなく、九重町は1984年を最後に発生が確認されていない。	生息地である高原湿地草原の、農地への改変による滅失	大分県RDB選定 情報不足
EN	ゾ、ツ	EN	シルビアシジミ	—	玖珠町，日田市（天瀬町），中津市	九重町，日田市，中津市（本耶馬溪町），宇佐市	1980年代半ば以降、急速に衰退しつつあり、絶滅したと思われる生息地が増えつつある一方で、生息が再確認できている産地もある。	河川堤防草地の改変が最大の要因	大分県RDB選定 絶滅危惧 IA類
EN	シ、 ゾ、ツ	EN	タイワンツバメシジミ	—	佐伯市（蒲江町）	杵築市，大分市（佐賀関町），白杵市，白杵市（野津町），日田市	1980年代半ば以降急速に減少傾向が進み、1960年代（杵築市、日田市），1980年代半ば（佐賀関町）に絶滅したと思われる生息地がある。1990年代以降蒲江町以外に確実な発生地が知られていない。	里山の過疎化による草地の放置、観光開発等による草地の滅失、食草の減少と生息環境の悪化	大分県RDB選定 絶滅危惧 IA類
EN	タ、テ	EN	ゴマシジミ	由布市（湯布院町），九重町	別府市，竹田市（久住町），竹田市（直入町），玖珠町，日田市（天瀬町）	由布市（庄内町）	1980年代半ば以降、各地で減少傾向があり、1990年代以降はより顕著である	火山草原の観光開発と、草地改良による生息地の大大幅な減少	大分県RDB選定 絶滅危惧 IB類
VU	タ、テ	VU	ヒメシロチョウ	—	由布市（庄内町），由布市（湯布院町），豊後大野市，竹田市（久住町），竹田市（直入町），竹田市，九重町，玖珠町，日田市（天瀬町）	—	近年発生が確認できない産地が増加しているが、2004年に豊後大野市で新たな産地が発見された	観光開発等による生息地草原の消失	大分県RDB選定 絶滅危惧 IB類
VU	ク	VU	オナガシジミ	—	由布市（庄内町），由布市（湯布院町），九重町	—	1980年代以降、年を追って減少傾向が進んでいる	食樹オニグルミの伐採と採集圧	—
VU	タ、テ	VU	ウラミスジシジミ	—	由布市（庄内町），由布市（湯布院町），竹田市（久住町），九重町	—	1980年代半ば以降、急速に発生地の減少により、衰退傾向が進んでいる	開発行為による高原疎林の伐採	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
VU	チ、ト	VU	メスアカミドリシジミ	由布市（庄内町），佐伯市（宇目町），豊後大野市（緒方町），竹田市（久住町），竹田市，九重町	別府市，由布市（湯布院町），中津市（耶馬溪町）	—	1990年代の後半から別府市をはじめ各発生地で、発生個体数の減少傾向が見られる	一部に採集圧もあるが、減少傾向の主要因は不明	—
VU	タ、テ	VU	クロシジミ	由布市（湯布院町），竹田市（久住町），九重町	杵築市（山香町），別府市，由布市（庄内町），大分市，佐伯市（宇目町），竹田市，日田市（前津江村），日田市（天瀬町），日田市，中津市（本耶馬溪町），中津市（耶馬溪町），宇佐市（安心院町）	—	1980年代半ば以降、各地で衰退傾向が目立つが、安定的に発生している産地も見られる	観光開発、都市化等による発生地草地の減少	大分県RDB選定 絶滅危惧 IB類 大分県特定希少野生動植物種指定を2019年7月1日に解除された
VU	タ、テ	VU	クロツバメシジミ	中津市（本耶馬溪町），中津市（耶馬溪町）	杵築市（山香町），九重町，玖珠町，日田市（大山町），日田市（天瀬町），中津市（山国町），宇佐市（院内町），宇佐市（安心院町）	中津市	中津市では1960年代に絶滅したと思われる。1990年代以降、各生息地で減少傾向が進んでいる	河川改修、開発行為による食草の減少、一部に採集圧	大分県RDB選定 絶滅危惧 IA類
VU	タ、テ	VU	オオウラギンヒョウモン	竹田市（久住町），玖珠町，日田市（天瀬町）	別府市，由布市（庄内町），由布市（湯布院町），白杵市，佐伯市（宇目町），豊後大野市（清川村），豊後大野市（緒方町），竹田市（直入町），竹田市，九重町，日田市（前津江村），日田市，中津市（本耶馬溪町），中津市	杵築市，大分市	1990年代以降、各産地で減少傾向が顕著。1970年代に少なくとも2市で絶滅したと思われる。 一部の産地では現在も生息が確認されている	火山草原の野焼き行事の衰退による森林化、開発による草地の滅失、河川堤防草地の植生変化などによる生息地草原の環境悪化	大分県RDB選定 絶滅危惧 IB類 大分県特定希少野生動植物種指定
VU	タ、テ	VU	ミスジチョウ	佐伯市（宇目町），豊後大野市（緒方町），竹田市	由布市（庄内町），白杵市（野津町），白杵市，豊後大野市（三重町），豊後大野市（清川村），竹田市（久住町），日田市（中津江村），中津市（本耶馬溪町），中津市（耶馬溪町），中津市（山国町）	大分市	1990年代以降、おもに河川沿いの生息地において減少傾向が見られる	河川改修、道路拡幅工事による生息環境の悪化	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
VU	ト、ヌ	VU	ウラナミジャノメ	別府市，由布市（庄内町），由布市（湯布院町），大分市（野津原町），大分市，竹田市，九重町，玖珠町，日田市（前津江村），日田市（天瀬町），日田市，中津市（本耶馬溪町），中津市（耶馬溪町）	杵築市，由布市（挿間町），白杵市，佐伯市（鶴見町），佐伯市，豊後大野市（大野町），中津市	—	1990年代以降、発生個体数の減少傾向が見られる。 個体数は少ないものの新たな産地や既産地で生息が確認されている	都市化による生息環境の滅失	大分県RDB選定 準絶滅危惧

40. 大分県 (Oita Pref.)

作成者名：玉嶋勝範¹⁾ 協力者名：三宅 武 作成年月：2019年12月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している産地 (市町村)	現在減少傾向にある 産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考 (対策・文献など)
V U	タ, テ	VU	クロヒカゲモドキ	—	由布市(庄内町), 由布市(湯布院町), 九重町, 日田市(前津江村), 日田市(中津江村)	—	各生息地とも生息範囲が非常に狭く, 1990年代以降, 減少傾向が続いている	観光開発による生息環境の悪化	大分県RDB選定 絶滅危惧 I B類
V U	タ, テ	VU	スジグロチャバネセセリ	—	由布市(庄内町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市(久住町), 竹田市, 九重町, 日田市(前津江村)	—	1990年代以降, 各産地で個体数の減少傾向が顕著となる。本来, 個体数の少ない種	開発による生息地草原の減少	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
N T	チ, ト	NT	ツマグロキチョウ	27市町村	別府市, 大分市	—	1990年代以降, 徐々に個体数が減少している地域がある	河川改修, 草地の開発による発生地の食草の減少	大分県RDB選定 準絶滅危惧
N T	チ, ヌ	NT	ウラクロシジミ	竹田市	豊後大野市(緒方町)	—	1990年代半ばから, 個体数の減少傾向が見られる	希少な種であり, 生息範囲も狭く, 食樹が採集圧によって相当数傷められている	大分県RDB選定 準絶滅危惧
N T	タ, テ	NT	ミドリシジミ	—	由布市(庄内町), 竹田市(久住町), 竹田市(直入町), 九重町	—	主要な生息地である飯田高原(九重町)では1980年代以降, 急速に衰退しつつある	観光開発と農地化による生息環境の喪失	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
N T	タ, テ	NT	アイノミドリシジミ	—	由布市(庄内町), 佐伯市(宇目町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市(久住町), 竹田市, 九重町	—	主要な生息地である飯田高原(九重町)では1980年代以降, 急速に衰退しつつある	観光開発と農地化による生息環境の喪失	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
N T	チ, ト	NT	カラスンジミ	由布市(庄内町), 白杵市, 佐伯市(宇目町), 白杵市(野津町), 豊後大野市(三重町), 竹田市(直入町), 竹田市, 日田市(中津江村), 中津市(三光村), 中津市(本耶馬溪町), 中津市(耶馬溪町), 宇佐市(院内町)	国東市(安岐町), 別府市, 由布市(挿間町), 大分市(野津原町), 大分市, 豊後大野市(緒方町), 豊後大野市(朝地町), 九重町, 玖珠町, 日田市(前津江村), 日田市(大山町), 日田市, 中津市(山国町), 宇佐市(安心院町), 宇佐市	—	1990年代以降, 各産地で減少傾向が目立っている。 近年ハルニレが残存する地域で新たな産地が確認されている	河川沿いの発生地の食樹の伐採	大分県RDB選定 準絶滅危惧
N T	チ, ト	NT	ミヤマカラスシジミ	竹田市(久住町), 九重町	別府市, 由布市(庄内町), 由布市(湯布院町), 竹田市(直入町), 竹田市	—	1980年代半ば以降, 一部の林縁部生息地で減少傾向が顕著である	観光開発, 道路改修による食樹の減失	—
N T	チ, ト	NT	スギタニルリシジミ	佐伯市(宇目町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市, 日田市(前津江村), 中津市(耶馬溪町), 中津市(山国町)	由布市(庄内町), 九重町, 日田市	—	1990年代半ばから, 一部の生息地で減少傾向が見られる。 新たな産地も確認されている	道路拡幅等の影響による生息環境の悪化	大分県RDB選定 準絶滅危惧
N T	チ, ト	NT	ウラギンヒョウモン	別府市, 由布市(庄内町), 由布市(湯布院町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市(久住町), 竹田市(直入町), 竹田市, 九重町, 玖珠町, 日田市(前津江村), 日田市(天瀬町), 日田市	杵築市, 由布市(挿間町), 大分市, 白杵市, 佐伯市, 豊後大野市(犬飼町), 日田市(上津江村)	—	高原の草地では現在も個体数の多い産地がある	草原疎林の開発による生息環境の悪化	—
N T	チ, ト	NT	ホシミスジ	国東市(国見町), 杵築市(山香町), 別府市, 由布市(湯布院町), 竹田市(直入町), 竹田市, 九重町, 宇佐市(安心院町)	豊後高田市(真玉町), 豊後高田市, 国東市(国東町), 杵築市, 由布市(庄内町), 大分市, 白杵市(野津町), 白杵市, 佐伯市, 竹田市(荻町), 竹田市(久住町), 中津市(三光村), 中津市(本耶馬溪町), 中津市(耶馬溪町), 中津市(山国町), 宇佐市(院内町), 宇佐市	—	1990年代以降, おもに疎林林縁の生息地において減少傾向が見られる。 近年個体数は少ないものの新たな産地が確認されている	開発行為による生息環境の悪化と, 食草の減少	大分県RDB選定 準絶滅危惧
N T	チ, ト	NT	シータテハ	由布市(庄内町), 佐伯市(宇目町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市, 九重町	由布市(湯布院町), 大分市(野津原町), 佐伯市(本匠村), 白杵市(野津町), 豊後大野市(三重町), 豊後大野市(清川村), 豊後大野市(朝地町), 豊後大野市(大野町), 竹田市(久住町), 竹田市(直入町), 日田市(前津江村), 日田市(中津江村), 日田市(天瀬町), 中津市(耶馬溪町), 中津市(山国町)	—	1990年代以降, 溪谷部の生息地において減少していた。 近年新たな産地が確認され, 分布域が広がっている	開発行為による食樹の伐採	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類

40. 大分県 (Oita Pref.)

作成者名：玉嶋勝範¹⁾ 協力者名：三宅 武 作成年月：2019年12月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している産地 (市町村)	現在減少傾向にある 産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考 (対策・文献など)
NT	チ, ト	NT	コムラサキ	—	別府市, 杣築市, 由布市(挾間町), 由布市(庄内町), 由布市(湯布院町), 大分市(野津原町), 大分市, 白杵市, 佐伯市, 豊後大野市(三重町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市(久住町), 竹田市(直入町), 竹田市, 九重町, 玖珠町, 日田市(前津江村), 日田市, 中津市(三光村), 中津市, 宇佐市	—	1990年代以降, おもに河川の生息地において減少傾向が見られる	河川改修や開発行為による生息環境の悪化と, 食草の減少	—
NT	ト	NT	オオムラサキ	沿岸地方を除くほぼ全市町村	大分市, 別府市	—	1990年代以降, 徐々に減少傾向が見られる	河川改修による食樹の伐採, スギ・ヒノキ植林等による生息環境の悪化	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
NT	チ, ト	NT	キマダラモドキ	由布市(庄内町), 由布市(湯布院町), 竹田市(久住町), 九重町, 玖珠町	別府市, 白杵市, 竹田市, 日田市(前津江村), 日田市(中津江村), 日田市(天瀬町), 日田市	大分市	大分市の生息地では1970年代に絶滅したと思われる。1980年代後半から1990年代に, 草原疎林の生息地で減少傾向が目立っている	草原疎林の開発と里山の過疎化による生息環境の悪化	大分県RDB選定 絶滅危惧 II類
NT	チ, ト	NT	ヒメキマダラヒカゲ	—	由布市(庄内町), 豊後大野市(緒方町), 竹田市(久住町), 竹田市, 九重町, 日田市(前津江村), 日田市(中津江村)	—	祖母山・傾山の周辺は鹿の食害によるスズタケの減少により個体数が著しく減少している地域がある	鹿の食害による食草の減少	—
NT	チ, ト	NT	ギンイチモンジセセリ	由布市(湯布院町), 大分市, 竹田市(久住町), 玖珠町, 日田市(天瀬町)	別府市, 由布市(庄内町), 豊後大野市(清川村), 豊後大野市(朝地町), 豊後大野市(大野町), 竹田市(直入町), 竹田市, 九重町, 日田市(前津江村), 日田市, 中津市(本耶馬溪町)	—	1990年代から個体数の減少傾向が見られる	生息地草地の環境変化	大分県RDB選定 準絶滅危惧
DD	ネ	DD	スジボソヤマキチョウ	—	竹田市	竹田市(久住町), 九重町	祖母山(竹田市), 九重山群(久住町, 九重町)で1950年代に採集され, その後記録は途絶えたが, 1986年に祖母山で再記録された	不明	大分県RDB選定 絶滅危惧 I B類
DD	ネ	DD	ヒサマツミドリシジミ	佐伯市(宇目町)	豊後大野市(緒方町)	—	1971年に緒方町での採卵が唯一の記録があつたが, 2016年に佐伯市宇目で発見された	生息地の森林伐採	大分県RDB選定 情報不足
DD	ネ	DD	オオルリシジミ	—	由布市(湯布院町)、竹田市(久住町)、九重町、玖珠町	別府市	別府市は1953年の記録があるのみで, その後の調査で確認されていない。 2006年から産地が相次いで確認されたが, 残存していたのか, 阿蘇地域からの飛来か, 人為的移入か不明である	牧草地の草地改良と, 観光開発による生息環境の滅失	大分県RDB選定 絶滅危惧 I A類 大分県特定希少野生動植物種指定で2019年7月1日から採集禁止となった

1) 〒870-1147 大分市ふじが丘山手区120-6